



Mein Fahrplan für die Gesundheit Ihres Kindes

(Dr. Karl Wagner, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Bahnhofstr. 6/3, 2640 Gloggnitz)

Zeitpunkt	Untersuchungen	Impfungen empfohlen / sinnvoll
in der 1. Lebenswoche - bei ambulanter Geburt (ansonsten Durchführung an der Geburtsabteilung vor Entlassung)	Untersuchung in der ersten Woche, Vitamin-K-Gabe PKU-Test („Fersenstich“ Stoffwechseluntersuchung) erste Hüftultraschall-Untersuchung, Hörtest	(erfolgt meist im Krankenhaus)
in der 2. Lebenswoche	Erster Besuch beim Kinderarzt, Gewichtskontrolle Nabelkontrolle, falls ausständig Hüftultraschall Beginn mit Vitamin-D-Tropfen 1x tgl 2 Tr.	
in der 5. Lebenswoche	1. Mutter-Kind-Pass Untersuchung, 4.-7. LW inkl. Orthopädische Kontrolle Gewichtskontrolle, erneute Vitamin-K-Gabe	<u>Ausführliche Besprechung und Planung der Impfungen</u>
in der 7. Lebenswoche	Gewichtskontrolle zweite Hüftultraschall-Untersuchung	erste Rotavirus-Schluckimpfung
in der 9. Lebenswoche	Gewichtskontrolle Besprechung allfälliger Fragen	erste Sechsfach-Impfung erste Pneumokokken-Impfung
mit 3 Monaten	2. Mutter-Kind-Pass Untersuchung, 3.-5. LM Wachstums- und Gewichtskontrolle	zweite Rotavirus-Schluckimpfung erste Meningokokken-B-Impfung
mit 4 Monaten	Gewichtskontrolle Besprechung der Ernährung Beginn mit Beikost-Einführung	zweite Sechsfach-Impfung zweite Pneumokokken-Impfung
mit 5 Monaten	Gewichtskontrolle Besprechung allfälliger Fragen	zweite Meningokokken-B-Impfung
mit 7 Monaten	3. Mutter-Kind-Pass Untersuchung, 7.-9. LM inkl. HNO-Untersuchung Besprechung der Zahnpflege	
mit 9 Monaten	Gewicht, Länge Besprechung von Entwicklung und Ernährung	erste MMR-Impfung (oder m.12 Mo) erste Varicellen-Impfung
mit 11 Monaten	Gewicht, Länge	dritte Sechsfach-Impfung dritte Pneumokokken-Impfung
mit 12 Monaten	4. Mutter-Kind-Pass Untersuchung, 10.-14. LM inkl. Augenuntersuchung	zweite MMR-Impfung zweite Varicellen-Impfung
mit 13 Monaten		erste FSME-Impfung erste Hepatitis-A-Impfung
mit 14 Monaten		zweite FSME-Impfung
mit 15 Monaten	Gewicht, Länge	dritte Meningokokken-B-Impfung
mit 18 Monaten	Gewicht, Länge Besprechung von Entwicklung und Ernährung	1xig Meningokokken-C-Impfung oder 1xig Meningokokken-ACWY



mit 20 Monaten		zweite Hepatitis-A-Impfung
mit 24 Monaten	5. Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 22.-26. LM Sprachtest: Wortschatz mit 3 Jahren	dritte FSME-Impfung
Nach dem zweiten Geburtstag erachte ich es als sinnvoll, Ihr Kind etwa jedes halbe Jahr zu untersuchen.		
Zeitpunkt	Untersuchungen	Impfungen empfohlen / sinnvoll
mit 2 ½ Jahren	Gewicht, Länge Entwicklung, Ernährung	
um den dritten Geburtstag	6. Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 34.-38. LM Sprachtest: Wortschatz mit 3 Jahren	etwaige Impfungen nachholen FSME, Hepatitis-A
mit 3 ½ Jahren	Gewicht, Länge Entwicklung, Ernährung	
um den vierten Geburtstag	7. Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 46.-50. LM	
mit 4 ½ Jahren	Gewicht, Länge Entwicklung, Ernährung	
um den fünften Geburtstag	8. Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 58.-62. LM inkl. Entwicklungstest, EKG, Harnuntersuchung, Blutbild	FSME-Auffrischung
Weitere mögliche bzw. empfohlene Impfungen und Untersuchungen:		
im Alter von 6 Jahren	Vor Schulbeginn: „Junior Check“ Entwicklung? Körperhaltung? venöse Blutentnahme, großes Blutbild, ggf. Titer	Auffrischung: Vierfachimpfung = Diphtherie/Tetanus/ Keuchhusten/ Kinderlähmung
im Alter von 8 Jahren	Entwicklung? Körperhaltung? venöse Blutentnahme, großes Blutbild, ggf. Titer	Auffrischung Hepatitis-B
im Alter von 10 Jahren	Allergien? Gewicht? venöse Blutentnahme, großes Blutbild, ggf. Titer	FSME-Auffrischung
im Alter von 11 Jahren		1xig Meningokokken ACWY HPV-Impfung (2x) = Gebärmutterhalskrebs, Feigwarzen
<p>FSME-Auffrischungsimpfung alle 5 Jahre (15, 20, 25...)</p> <p>Vierfachimpfung (Auffrischung Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung) alle 10 Jahre (15, 25, 35...)</p> <p>Hepatitis-A+B Auffrischung alle 10 Jahre, oder Titerbestimmung</p>		